

Galactografie

Patiënteninformatie

Definitie

Dit is een radiologisch onderzoek van de borstklier, waarbij contrastvloeistof wordt ingespoten in een melkgang. Dit onderzoek gebeurt om abnormaal vochtverlies uit de tepel te onderzoeken.

Vorbereiding

- Er is geen bijzondere voorbereiding nodig.
- Best wordt het onderzoek uitgevoerd in de week volgend op de vijfde dag van de maandstonden. De borst is dan minder vochtrijk en het minst gespannen. De noodzakelijke borstcompressie is dan minder pijnlijk en de kwaliteit van de beelden is dan ook beter
- Gebruik voor het onderzoek geen cosmetica, crèmes of deodorants. Deze beïnvloeden de kwaliteit van de beelden
- Breng vroegere mammografiebeelden mee

Verloop

- Het is mogelijk dat er eerst een mammografie wordt gemaakt als referentiepunt voor de radioloog
- Vervolgens wordt de borst ontsmet waarna de dokter via het tepelkanaal een contrastvloeistof inspuit
- Er zal een mammografie genomen worden, mogelijk in meerdere richtingen
- Na het onderzoek wordt de contrastvloeistof door de arts uit de borst geduwd via de tepel
- Het is een beperkt pijnlijk onderzoek, u kan namelijk wat prikkelingen voelen
- Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten

Nazorg/opmerkingen

Na het onderzoek wordt de borst gereinigd en ontsmet. De ingespoten vloeistof zal gedeeltelijk via de tepel terugvloeien en deels door het lichaam via de urine uitgescheiden worden.

Contact

Secretariaat medische beeldvorming, tel. 012 39 78 22