

TILT-test

Informatieblad

Een TILT-test wordt ook kantelafeltest genoemd. Deze test wordt uitgevoerd bij patiënten die last hebben van flauwvallen of duizeligheid. De bedoeling van de test is om deze gewaarwordingen uit te lokken onder toezicht van een verpleegkundige zodat de oorzaak kan achterhaald worden. Dit onderzoek duurt ongeveer één uur.

Vorbereiding

Ten minste vier uur voor het onderzoek moet u nuchter zijn.

Verloop van het onderzoek

- Er wordt u gevraagd te gaan liggen op een onderzoekstafel
- Elektroden voor een ECG (elektrocardiogram) en de manchetten voor de bloeddrukmeting worden aangelegd
- Na deze voorbereiding wordt de tafel rechtop gezet, niet helemaal recht maar lichtjes achteruit hellend
- Vanaf dan wordt de bloeddruk regelmatig gemeten, het ECG gevolgd en wordt nagegaan of u al dan niet klachten krijgt zoals flauwvallen of duizeligheid
- Als er geen klachten optreden blijft u gedurende 45 minuten in deze positie staan. Daarna wordt de test beëindigd
- Bij draaierigheid, misselijkheid of dreigend bewustzijnsverlies wordt de tafel onmiddellijk terug horizontaal gezet en is de test afgelopen

Resultaten

Het verslag wordt na het onderzoek aan de behandelende arts bezorgd. Deze bekijkt de resultaten en stuurt een verslag ervan naar uw huisarts.

Nazorg

Dit onderzoek vereist geen verdere nazorg.

Contact

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw arts of een verpleegkundige op de afdeling.

Hartcentrum az Vesalius
Hazelereik 51
3700 Tongeren

Tel. 012 39 70 84