



TER INFORMATIE

Te kort voorhuidriempje

→ **Ingrep: frenulotomie (insnijden voorhuidriempje)**

Om te ontsmetten : de voorhuid naar achter brengen en **Terra-cortril®** suspensie aanbrengen thv de hechtingen. De voorhuid goed weer over de eikel brengen. Doe dit 2-3x/dag.

Te nauwe voorhuid of fimosis

→ **Ingrep: circumcisie, volledig of gedeeltelijk.**

Enkel bij een gedeeltelijke circumcisie: voorhuid naar achter brengen en **Terra-cortril®** suspensie aanbrengen thv de hechtingen. De voorhuid goed weer over de eikel brengen. Doe dit 2-3x/dag.

Bij volledige circumcisie alleen 2x/d **Terra-cortril®** suspensie aanbrengen thv de hechtingen.

De **hechtingen** resorberen vanzelf, tenzij anders aangegeven werd.

Douchen mag met de voorhuid naar voor. Best gedurende 10dagen niet te laten baden en zwemmen.

NA de operatie komt u op controle

op: / / om uur

Ziekenhuis *Tongereren / Bilzen*



Ook bij een dagopname dienen de bezoeken gerespecteerd te worden (van 14u tot 20u)

In het belang van uw kind en de andere patiëntjes vragen wij uw andere kinderen thuis te laten.

VERLOOP VAN DE DAG

Binnenkort zal uw kind een ingreep ondergaan. Hiervoor is een dagopname op de afdeling pediatrie noodzakelijk.

Lees alvast even deze informatiebrochure om een overzicht te krijgen over het verloop van deze dag.

BELANGRIJK: Uw kind mag niet meer drinken en eten vanaf middernacht!

INKOMHAL → inschrijven
Kids ID kaart (of ISI+) + verzekeringskaart

PEDIATRIE B5 → aanmelden aan de balie
Opname door verpleegkundige

OPERATIEZAAL D4 → 1 ouder mag mee
(bij kinderen < 14jaar)
Behalve bij dringende urgenties

Enige tijd voor de ingreep krijgt uw kind een **premedicatie**. (Afhankelijk van het gewicht en leeftijd wordt de medicatie rectaal of oraal toegediend) Uw kind krijgt hiervan een slaperig gevoel, vanaf nu mag het **NIET** meer rondlopen.

Eén van de ouders mag mee naar het operatiekwartier (aanduiden op de vragenlijst). U blijft bij uw kind tot het onder narcose is.

Ter voorbereiding de ingreep wordt er een infuus geplaatst. (Via een katheter in de hand of in de voet wordt er extra vocht en pijnstilling toegediend). Bij kleine kinderen gebeurt dit na toediening van lachgas, zodat uw kind al indommelt. Het infuus kan nu pijnloos geplaatst worden.

Tijdens de ingreep blijft uw kind onder constante supervisie van anesthesie. Deze supervisie blijft zo tot het kind goed wakker is.

Na de ingreep komt uw kind terug naar de afdeling pediatrie.

Uw kind zal nog moe en/of wat verdrietig zijn. Het is nu belangrijk uw kind te laten **RUSTEN**.

Pas enkele uren na de ingreep en op advies van de verpleegkundige mag uw kind wat drinken. We starten steeds met een beetje water, is uw kind niet misselijk, dan krijgt het aangepaste voeding. Indien er zich geen bijzonderheden voordoen en uw kind geplast heeft, komt de verpleegkundige het infuus verwijderen.

Op het einde van het operatieprogramma komt de dokter nog even langs op de kamer om uitleg te geven over het verloop van de operatie. De dokter bepaalt dan ook het uur van ontslag.

BELANGRIJK VOOR DE VOLGENDE DAGEN:

- ◆ Uw kind doet het best wat **rustig** aan: niet rennen, springen,...
- ◆ Mag wel de woonst verlaten.
- ◆ **Vermijd warmte:** niet in de volle zon komen, geen warme douche/bad,...
- ◆ **Aangepaste voeding:** Het is aangeraden uw kind de eerste dag licht verteerbare voeding te geven in verband met de nawerking van de narcose.
- ◆ **Pijnstilling:** indien nodig geeft u de avond na de operatie nog iets tegen de pijn, eventueel ook de volgende dagen.
- ◆ Bij **hoge koorts** (boven 38.5° C), pijn die niet onder controle is met de gangbare pijnstillers, of bij forse nabloeding contacteert u best uw huisarts of uw arts via de dienst spoedgevallen(of het centrale nummer van a.z. Vesalius : T. 012 396 111).
- ◆ De penis kan nog enkele weken **gezwollen** zijn, dit zal spontaan verdwijnen.

Mocht u toch nog vragen hebben dan kan u die gerust stellen aan de arts of verpleegkundige.

Wij wensen uw kind een spoedig herstel toe!